



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

GIDAYI KORU
DÜNYAYA SAĞLIK ÇIK

TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	MATAR TARIM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA İNŞAAT TURİZM HAYVANCILIK ANALİZ LABORATUVARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Lisans Türü	Üretici
Lisans No	1760
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	BORON ETANOL AMİN
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	EC FERTİLİZER
Tescil No	30437
Marka veya Ticari Adı (varsa)	GLOBER BORON
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı	MATAR TARIM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA İNŞAAT TURİZM HAYVANCILIK ANALİZ LABORATUVARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Gübre Tip İsmi	BORON ETANOL AMİN
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	Suda Çözünür Bor(B):11
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı ve Miktarı	
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	Türkiye
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	0,25 - 0,5 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 lt 0,335 - 0,67 - 1,34 - 2,68 - 4,02 - 5,36 - 6,7 - 13,4 - 20,1 - 26,8 - 33,5 - 40,2 - 46,9 kg
Depolama Sıcaklığı	-10 / 40 °C
Diğer İşaretler	Firma Beyanı Diğer Güvenlik Tedbirleri Uygulama Şekli, Dozu ve Zamanı Son Kullanma Tarihi Üretim Tarihi Firma Adı ve Adresi Uyarılar
Veriliş Nedeni	SÖRE UZATIMI
Bu belge 26/10/2022 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

Bu belge 09/06/2021 tarih ve 31506 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir.

Tarih:26/10/2022

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkanı V.

EC FERTİLİZER
BORON ETANOL AMİN
GLOBER BORON

Garanti Edilen İçerik
Suda Çözünür Bor(B)

(w/w)
% 11

UYARILAR:

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ. ÇOCUKLARDAN VE GİDALARDAN UZAK TUTUNUZ.

DERİ VE GÖZ TEMASINDAN KAÇININIZ. SADECE İHTİYAÇ OLAN YERLERDE KULLANINIZ.

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ.

TOPRAK VE/VEYA YAPRAK ANALİZİ YAPTIRILARAK GÜBRE KULLANILMASI TAVSİYE EDİLİR.

Hazırlanışı ve Uygulama Şekli: Kullanmadan önce ambalajında iyice çalkalayınız. Uygulama aletinin deposu 2/3 oranında su ile doldurulur. Öncelikle önerilen dozda Globor Boron eklenerek yeterli miktarda su ile karıştırılır ve uygulamaya geçilir.

KULLANILDIĞI BİTKİLER VE KULLANMA DOZU:

Kullanılacak Bitki	Kullanım dozları		Kullanım Zamanı
	Yapraktan (cc/da/100 lt su)	Damla Sulamadan (cc/da/1000 lt su)	
Domates, Biber, Hıyar, Patlıcan, Kavun, Karpuz, Kabak, v.s.	100-200 cc	300-500 cc	Fide ekiminden sonra ilk uygulama yapılır. 15 gün sonra tekrar edilir.
Narenciye	100 - 200 cc	300-500 cc	Hasattan sonra çiçeklenmeden önce uygulanır.
Sert Çekirdekli Meyveler (Kiraz, Vişne, Kayısı, Şeftali, Erik, v.s.)	100 - 200 cc	400-500 cc	Çiçeklenmeden önce ilk uygulama ve hasattan sonra ikinci uygulama tavsiye edilir.
Yumuşak Çekirdekli Meyveler (Elma, Armut, Ayva, v.s.)	100 - 200 cc	300-500 cc	Çiçeklenmeden önce ilk uygulama ve hasattan sonra ikinci uygulama tavsiye edilir.
Muz	100 - 200 cc	300-500 cc	Doğum döneminde uygulanır.
Çilek	100-150 cc	300-500 cc	Çiçeklenmeden önce ilk uygulama yapılır. 15 gün sonra tekrar edilir.
Bağ-Kivi	100 - 200 cc	300-500 cc	Göz kabarmasında ilk uygulama yapılır. Çiçeklenmeden önce ikinci uygulama tavsiye edilir.
Zeytin	100 - 200 cc	400-500 cc	Çiçeklenmeden önce uygulanır.
Patates, Şeker Pancarı, Havuç	100-500 cc	300-500 cc	Ekim öncesinde topraktan 500 cc dozunda ilk uygulama yapılır. Bitki boyu 10-15 cm olduğunda 100 cc dozunda ikinci uygulama tavsiye edilir.
Tahıllar (Buğday, Arpa, Çeltik, v.s.)	100 - 200 cc	-	Kardeşlenme döneminde uygulanır.
Pamuk	100 - 200 cc	300-500 cc	Koza oluşumundan önce uygulanır.
Fasulye, Mercimek, Nohut, v.s.	100 - 200 cc	300-500 cc	Gelişme dönemi boyunca uygulanır.
Fındık, Ceviz, Antep Fıstığı	100 - 200 cc	300-500 cc	Çiçeklenmeden önce uygulanır.
Yapraklı Yenen Sebzeler (Marul, Kıvrıkcık, Lahana, v.s.)	100 - 200 cc	300-500 cc	Şaşırtmadan veya çıkıştan 10-15 gün sonra uygulanır.
Soğan, Sarımsak	100 - 200 cc	300-500 cc	Bitki boyu 10-15 cm olduğu dönemde uygulanır.
Mısır, Ayrıçığı	100-500 cc	300-500 cc	Ekim öncesinde topraktan 500 cc dozunda ilk uygulama yapılır. Bitki boyu 10-15 cm olduğunda 100 cc dozunda ikinci uygulama tavsiye edilir.
Kanola	75-100 cc	-	-

Karışılabilirlik: Güçlü alkali ve asidik kimyasal bileşimlerle karıştırmayınız. Yabancı ot ilaçları ile uygulanabilir. Ön deneme yapılması tavsiye edilir.

Depolama ve Uyarılar: İyi havalandırılmış, direkt gün ışığı almayan serin ve kuru şartlar altında (minimum -10°C ile maksimum +40°C) kendi ambalajında kapalı olarak depolandığı takdirde ürünün fiziksel ve kimyasal özelliklerinde tolerans sınırları dışında bir değişiklik olmaz. Gıda ve yiyeceklerden, su kaynaklarından uzak yerlerde depolanmalıdır.

Firma Yükümlülüğü: Firma ürün etiketinde belirtilen özelliklerden sorumludur ve kullanımı firma kontrolü dışındadır. Farklı kullanımlarda ön deneme yapılması tavsiye edilir. Bu nedenle depolama koşullarından veya kullanımından kaynaklanacak problemlerden firma sorumlu değildir.

Bakanlık Lisans No:

Bakanlık Tescil No:

Üretim Tarihi :

Son Kullanma Tarihi:

Şarj No :

NET HACİM / AĞIRLIK : 1 L / 1,34 kg

İthalatçı Firma:

MATAR Tarım Ürünler. Paz. İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Onur Mah. Tekel Cad. Kıza İş Merkezi Sit. A1 Blok Apt.

No: 1/202 Seyhan/ADANA

Tel: 0 322 457 78 76 Fax: 0 322 454 39 83

www.matatarim.com.tr / info@matatarim.com.tr



Piyasaya sunacağımız **GLOBER BORON** adlı ürünün etiketinin Yönetmeliğine uygun olarak hazırlandığını ve piyasada bu etiketin kullanılacağını beyan eder, aksi takdirde 4703 Sayılı Kanun gereğince yapılacak tüm soruşturma ve cezai müeyyideleri peşinen kabul ederiz.

